

| 和名 | 分類 | 特徴ほか | 会える場所 | | | |
|---------|---------|-----------|-------|------------------|------|----------|
| | | | ハイム | 多摩川土手 (中野島周辺) | 生田緑地 | その他 |
| ナガサキアゲハ | アゲハチョウ科 | 尾のない黒いアゲハ | ○ | x | ○ | 関東太平洋岸以西 |



生田緑地 5月上旬 タニウツギで吸蜜



↑ 生田緑地 8月上旬 スイカズラで吸蜜する
オナガアゲハを追うナガサキアゲハ

| 成虫発生時期 (月) | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 食草 ○ 食樹 | | | | | | 発生回数/年 | | | 越冬形態 | | |
| ミカン類 | | | | | | 3~5 | | | 蛹 (さなぎ) | | |

黒いアゲハチョウとしてこのあたりで見られるのは、クロアゲハ、オナガアゲハ、モンキアゲハ、そしてナガサキアゲハです。ナガサキアゲハのみ尾（尾状突起）がないのですぐにわかりますが、ナガサキというだけあって元は南方系のアゲハで九州、四国の蝶だったのが温暖化に伴い北上して、生田緑地にも定着し、最近ではハイム内でも飛んでいるのが見られます。

オスの羽の表は真っ黒ですがメスは、写真のように前羽つけねに赤紋、後羽に白い紋があり、この白い紋は南に行くほど広がる傾向があります。

↓ 生田緑地 5月上旬 ♀

